

Классификация.

Российская классификация ВИЧ-инфекции (В.В. Покровский, 2001г.)

1. Стадия инкубации

2. Стадия первичных проявлений

Варианты течения:

A. Бессимптомная;

B. Острая ВИЧ-инфекция без вторичных заболеваний;

B. Острая инфекция с вторичными заболеваниями.

3. Латентная стадия

4. Стадия вторичных заболеваний

4А.Потеря веса менее 10%, грибковые, вирусные, бактериальные поражения кожи и слизистых оболочек; опоясывающий лишай; повторные фарингиты, синуситы. (тромбоцитопения)

Фазы: Прогрессирование (на фоне отсутствия противовирусной терапии, на фоне противовирусной терапии).

Ремиссия (спонтанная, после ранее проводимой противовирусной терапии, на фоне противовирусной терапии).

4Б. Потеря веса более 10%; необъяснимая диарея или лихорадка более 1 месяца; волосистая лейкоплакия языка; туберкулез легких; повторные или стойкие вирусные, бактериальные, грибковые, протозойные поражения внутренних органов; повторный или диссеминированный опоясывающий лишай; локализованная саркома Капоши. (рак шейки матки, лимфогрануломатоз)

Фазы: Прогрессирование (на фоне отсутствия противовирусной терапии, на фоне противовирусной терапии).

Ремиссия (спонтанная, после ранее проводимой противовирусной терапии, на фоне противовирусной терапии).

4В. Кахексия; генерализованные бактериальные, вирусные, грибковые, протозойные и паразитарные заболевания; пневмоцистная пневмония, кандидоз пищевода, бронхов, легких; внелегочный туберкулез; атипичные микобактериозы; диссеминированная саркома Капоши; поражения ЦНС различной этиологии.

Фазы: Прогрессирование (на фоне отсутствия противовирусной терапии, на фоне противовирусной терапии).

Ремиссия (спонтанная, после ранее проводимой противовирусной терапии, на фоне противовирусной терапии).

5. Терминальная стадия

В 5 стадии имеющиеся у больных вторичные заболевания приобретают необратимое течение. Даже адекватно проводимые противовирусная терапия и терапия вторичных заболеваний неэффективны, больной погибает в течении нескольких месяцев